



Laboratoire départemental d'analyses
et de recherche

AzoFERT®

Jean-Marie MACHET, Pascal DUBRULLE
INRA Unité Agro-Impact

Nathalie DAMAY
Laboratoire Départemental d'Analyses
et de Recherche

Emmanuel PHILIPPON
Master de l'Université de technologie
Compiègne



diffuseur

AZOFERT® est un logiciel d'aide à la décision pour la fertilisation azotée des cultures. Il est basé sur la méthode d'un bilan d'azote minéral complet. A partir d'une mesure du reliquat d'azote minéral, il permet de calculer la dose optimale d'engrais à apporter à une parcelle. Il prend en compte :

- ▶ les fortes exigences actuelles en matière de production de qualité,
- ▶ l'évolution des pratiques agricoles (avec une augmentation et une diversification des apports organiques),
- ▶ la protection de l'environnement (eau, air).



AZOFERT® intègre les connaissances agronomiques des 15 dernières années. Il estime notamment :

- ▶ la dynamique temporelle des fournitures d'azote,
- ▶ la minéralisation nette de l'azote humifié du sol et des différentes sources organiques,
- ▶ le lessivage des nitrates,
- ▶ la volatilisation et l'organisation microbienne de l'engrais.



AZOFERT® a été réalisé par l'INRA, Institut National de Recherche Agronomique (Unité d'Agronomie de Laon-Reims-Mons) et le LDAR, Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche (Station Agronomique de l'Aisne). Il est appelé à remplacer le logiciel AzoBil®, jusqu'ici la référence de la fertilisation raisonnée en France. La version 1.0, adaptée au contexte climatique tempéré, couvre 40 cultures annuelles de plein champ.


Présentation du logiciel

L'informatisation du conseil permet :

- ▶ des calculs fiables et rapides,
- ▶ une prise en compte du contexte pédo-climatique de la parcelle,
- ▶ une prise en compte des pratiques culturales de l'agriculteur.

Le conseil sur AzoFert® est donc *fiable, affiné* et *personnalisé*.

Azofert® est conçu pour être intégré au système de gestion du laboratoire utilisateur. Il fonctionne en trois phases :



1- SAISIE : L'expert peut introduire si besoin : ses propres références régionales sur le contexte agricole, un fichier climat, ses propres commentaires. L'opérateur renseigne les données de la parcelle en fonction de la fiche de renseignements remplie par l'agriculteur.

2- TRAITEMENT : Le logiciel complète si besoin les données d'entrée et calcule chacun des postes du bilan pour établir son conseil.


3- EDITION : Si les données d'entrées sont suffisantes et cohérentes, le logiciel rassemble dans un fichier de sortie les variables utilisées dans ses calculs et le résultat détaillé de l'interprétation.

La méthode du « bilan prévisionnel complet »

Pour calculer la dose d'engrais, AzoFert® utilise la « méthode du bilan prévisionnel ». On met en balance les besoins prévisibles d'une culture avant l'apport d'engrais avec les différentes sources d'azote contribuant à l'alimentation de cette culture. On préconise la dose d'engrais à apporter pour rétablir l'équilibre.

Cet équilibre est schématisé sous forme d'équation. On a :

Besoins en azote = Fournitures en azote + Dose d'engrais conseillée.



Voici la liste des différents postes considérés par le logiciel pour calculer la dose d'engrais X :

Besoins totaux

- Besoins en azote (Pf)
- Reliquat fermeture (Rf)

Azote fourni par le sol

- Azote absorbé à l'ouverture (Pi)
- Reliquat à l'ouverture (Ri)
- Minéralisation de l'humus (Mh)
- Retournement prairie (Mp)

Azote non-utilisable

- Lessivage (Ls)
- Organisation microbienne (Ix)
- Volatilisation (Gx)


Autres fournitures d'azote

- Cultures intermédiaires (Mci)
- Résidus de culture (Mr)
- Apports par l'eau (Ap et Ir)
- Amendements (Ma)
- Fixation symbiotique (Fs)

Le temps normalisé

Les ressources en azote dépendent largement des conditions climatiques. Alors que les anciens logiciels fonctionnaient à partir de données forfaitaires sur le climat, AzoFert® peut prendre en compte directement les données météorologiques grâce au concept de « **Temps normalisé** » : Les facteurs température et humidité sont modélisés afin de convertir les données exprimées en nombre de jours calendaires en nombre de « **jours normalisés** ».


Un jour normalisé correspond à un jour à une température de 15°C et à une humidité du sol à la capacité au champ.



La prise en compte du climat

Pour les différentes parcelles agricoles, les données climatiques peuvent être intégrées dans un domaine de paramétrage d'AzoFert® sous forme de fichier texte.

- ▶ **Pour la période qui précède l'ouverture du bilan**, le modèle calcule *a posteriori*, l'évolution des différents compartiments organiques et de l'azote minéral du sol jusqu'à la date d'ouverture. Il se réfère pour cela au climat réel.
- ▶ **Pour la période qui suit l'ouverture du bilan**, le modèle simule *a priori*, l'évolution de ces compartiments en utilisant un climat moyen.



Les données climatiques utilisées dans le modèle sont des données décennales sur 2 ans (année précédente et année en cours)

- ▶ la température moyenne
- ▶ la pluviométrie
- ▶ l'évapotranspiration potentielle
- ▶ le rayonnement global

Les différents postes du bilan

Pour calculer la dose d'azote, AzoFert® doit évaluer les postes du bilan. On peut distinguer : les besoins en azote à l'ouverture du bilan, l'azote utilisable et l'azote non-utilisable.

Le besoin en azote à l'ouverture du bilan ($P_f - P_i$) correspond aux besoins de la plante pour une croissance optimale. AzoFert® distingue :

- le besoin total de la plante (P_f) ;
- l'azote déjà absorbé à l'ouverture (P_i) pour certaines cultures.

L'azote utilisable correspond :


- à l'azote présent dans le sol à l'ouverture du bilan (R_i) ;
- à la minéralisation de l'humus (M_h), des résidus de culture (M_r), des cultures intermédiaires (M_{ci}), des résidus prairiaux éventuels (M_p) et des produits organiques (M_a) ;
- aux apports par l'eau de pluie (A_p), par l'irrigation (I_r) et par la fixation symbiotique (F_s).

L'azote non utilisable correspond à l'azote qui peut :

- être perdu comme lors du lessivage (L_s) ou de la volatilisation (G_x) ;
- rester dans le sol par organisation microbienne (I_x) ;
- rester dans le sol à la fermeture du bilan (R_f).



Besoin en azote
à l'ouverture du bilan



Azote utilisable



Azote perdu
ou inutilisable

Besoins en azote (Pf)



Les besoins en azote sont calculés différemment pour :

- ▶ **Les cultures récoltées en grains :** céréales d'hiver et de printemps, maïs, lin, tournesol... AzoFert® calcule les besoins pour deux objectifs de rendement prévus par l'agriculteur et l'objectif déterminé par AzoFert®. Ensuite, cet objectif est multiplié par le besoin en azote par unité de production de la culture considérée. Le besoin variétal est pris en compte quand il est connu.



- ▶ **Les cultures pour lesquelles le besoin est fonction de la durée du cycle de la culture et de l'objectif de production.** C'est le cas de la pomme de terre. Des tableaux de besoins en azote sont proposés par type de pomme de terre et par bassin de production.



- ▶ **Les cultures avec un besoin forfaitaire en azote** (betteraves, endives, légumes de plein champ). La valeur forfaitaire correspond à une moyenne validée dans les zones de production de ces cultures.




Azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan (Pi)



L'azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan est à considérer pour les cultures implantées en automne, qui ont atteint un certain stade de développement à la date d'ouverture du bilan. Ce sont essentiellement les céréales d'hiver et le colza d'hiver. En général, il y a une liaison étroite entre l'azote absorbé et la quantité de biomasse végétale produite :


- ▶ **Pour les céréales d'hiver**, la quantité d'azote absorbé à l'ouverture du bilan est généralement comprise entre 0 et 50 kg N/ha. AzoFert® estime Pi à partir d'un modèle de croissance ou du stade végétatif.
- ▶ **Pour le colza d'hiver**, la quantité d'azote absorbé à l'ouverture du bilan peut varier de 5 à plus de 100 kg N/ha. AzoFert® prend en compte soit une mesure directe de l'azote absorbé (pesée), soit un état de développement.



Reliquat d'azote minéral à l'ouverture du bilan (Ri)



Le reliquat d'azote minéral à l'ouverture du bilan correspond à la quantité d'azote minéral mesurée dans le sol sur une profondeur correspondant à la profondeur d'enracinement des cultures. Il comprend l'azote ammoniacal sur la profondeur de labour et l'azote nitrique sur la profondeur du profil.



Le prélèvement

La phase de prélèvement est essentielle pour qu'AzoFert® puisse donner un conseil fiable. Le prescripteur doit veiller à ce que :

- ▶ la profondeur totale du profil analysé corresponde à la profondeur d'enracinement de la culture.
- ▶ le prélèvement soit pratiqué par horizons de sol de 30 cm.
- ▶ chaque échantillon soit représentatif d'une parcelle homogène, c'est-à-dire ayant un même type de sol et un même passé cultural.
- ▶ chaque échantillon soit lui-même homogène, c'est-à-dire composé de 8 à 15 prélèvements unitaires effectués sur une zone représentative de la parcelle (500 g de terre ou plus par horizon).
- ▶ l'échantillon soit conservé à 3 °C et acheminé au froid le jour du prélèvement, ou congelé directement.

Minéralisation de l'azote humifié (Mh)

+ N


Pour estimer la minéralisation de l'azote humifié, on prend en compte :

- ▶ le stock d'azote organique humifié (teneur en azote total du sol)
- ▶ le type de sol (teneur en argile vraie, en calcaire total)
- ▶ la température et l'humidité du sol
- ▶ la politique de restitution organique

 *Prise en compte de la politique de restitution organique :*

L'estimation de l'azote organique est pondérée en particulier par :

1 Le devenir des résidus de récolte :



2 La nature et la fréquence des apports de produits organiques :


Les produits à décomposition lente : fumiers, composts, etc.



Les produits à décomposition rapide : lisiers, vinasses, fientes, boues liquides, etc.



Décomposition des matières organiques (Mr, Mci, Ma, Mp)



Azofert® prend en compte l'azote produit par la décomposition des différentes matières organiques retournant au sol. Celles-ci peuvent provenir :

☞ Des résidus de culture Mr :

On considère alors : la nature du précédent, la quantité de résidus estimée par le rendement du précédent, la quantité d'azote apportée sur le précédent, la date de récolte du précédent, le devenir des résidus de récolte (enfouis, enlevés ou laissés en surface).

☞ Des cultures intermédiaires Mci :


On considère alors : la nature de la culture intermédiaire, son rendement, sa date de destruction.

☞ Des apports de produits organiques Ma :

On considère alors la nature du produit, sa teneur en C, N et N minéral, la quantité apportée, la date d'apport.

☞ Des résidus prairiaux Mp :

On considère alors la durée de la prairie et la date de retournement.




Chaque matière organique restituée ou apportée est caractérisée par une cinétique de décomposition spécifique, exprimée en temps normalisé.

Apports d'azote par l'eau (Ap et Ir)

+ N

AzoFert® prend en compte les apports d'azote par l'eau de pluie (Ap) ou l'eau d'irrigation (Ir)

Les apports par l'eau dépendent de la quantité d'eau ainsi que de sa concentration en nitrates.



Calcul de Ap

La quantité de pluie est estimée entre la date de mesure du reliquat et la date de fin d'absorption d'azote de la culture


Calcul de Ir

On a par exemple pour un apport de 180 mm d'une eau à 40 mg de NO_3/l un apport d'azote de $(180 \times 40) / 443$ soit 16 kg N/ha


Apport par fixation symbiotique (Fs)

+ N

Pour les cultures capables de fixer l'azote par voie symbiotique, il n'y a généralement pas besoin d'apport d'engrais azoté. Cependant, certaines légumineuses comme les haricots nécessitent une fertilisation azotée, car la mise en place de la symbiose arrive trop tardivement dans le cycle de développement. Pour ces cultures, Azofert® intègre forfaitairement une quantité d'azote qui sera fixée par voie symbiotique.



Reliquat d'azote minéral à la sortie du bilan (Rf)




Le reliquat d'azote minéral à la sortie du bilan correspond à la quantité d'azote minimale qui va demeurer dans le sol.

On l'évalue au moment où la culture n'absorbe plus d'azote, soit :

- ▶ à la date de la récolte (ex : betteraves sucrières) ;
- ▶ 3 semaines à 1 mois avant récolte pour une céréale d'hiver, au défanage pour la pomme de terre).

Rf est estimé sur la même profondeur de sol que le reliquat à l'ouverture du bilan.




Pertes d'azote par lessivage (Ls)



Après le prélèvement de sol pour la détermination du reliquat d'azote minéral, la pluviométrie peut entraîner des pertes d'azote nitrique par lessivage au-delà de la profondeur d'exploration racinaire de la culture (Ls).

La quantité d'azote lessivée dépend :

- ▶ de la pluviométrie efficace ($P - kETP$),
- ▶ du type de sol (nature de la couche arable et du sous-sol),
- ▶ de la quantité de reliquat azoté présente et de sa répartition dans le sol.




Pertes gazeuses par volatilisation (Gx)



AzoFert® prend en compte les pertes gazeuses aux dépens des engrais minéraux et des produits organiques.

Les pertes par volatilisation d'ammoniac (Gx) interviennent dans les quelques heures à quelques jours consécutifs aux épandages des engrais qui contiennent de l'azote sous forme uréique et/ou ammoniacale. Les pertes calculées sont :

- ▶ proportionnelles à la quantité d'azote apportée,
- ▶ fonction du type et de la forme d'engrais (liquide ou solide),
- ▶ fonction du type de sol (pH et CEC),
- ▶ fonction du type d'application (enfouis ou en surface).



Organisation microbienne de l'azote de l'engrais (Ix)




Une partie de l'azote de l'engrais est toujours utilisée par la biomasse microbienne du sol pour la décomposition des différentes sources organiques. Cet azote n'est pas disponible pour la plante.

Les travaux récents montrent que cette quantité est déterminée :

- ▶ par la disponibilité en carbone,
- ▶ par la disponibilité en azote minéral présent dans le sol.

AzoFert® utilise ces deux critères pour estimer Ix dans le calcul du bilan.




Calcul de la dose d'azote par le bilan (X)

Tous les postes précédents ont pour but de calculer X, la dose d'engrais conseillée pour une parcelle.

En résumé, AzoFert® fonctionne à partir de modèles de calculs établis par les chercheurs agronomes. En utilisant pour une parcelle un ensemble de données (mesure du reliquat par le laboratoire d'analyse, fiche de renseignements parcellaires, données climatiques et paramètres d'AzoFert®), le logiciel va déterminer une dose d'azote minéral conseillée à partir de laquelle l'agriculteur pourra décider de sa fertilisation.

A partir d'un ensemble de données...

AzoFert® calcule la dose d'engrais: X



$$X = (Pf - Pi + Rf + Ix + Gx + Ls) - (Ri + Mh + Mr + Mci + Ma + Mp + Ap + Fs + Ir)$$



Laboratoire Départemental
d'Analyses et de Recherche

rue Fernand Christ
02007 LAON Cedex

Tél. : +33 (0) 03 23 23 64 70
Fax : +33 (0) 03 23 23 64 99

- RELIQUATS D'AZOTE MINERAL -

FICHE DE RENSEIGNEMENTS AZOFERT

A REMPLIR EN MAJUSCULES

Echantillon(s)

n° _____ à _____

n° parcelle _____

Enregistré(s) par _____

Arrivé(s) le : _____

▲ Cadre réservé au labo ▲

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Exploitant	Intermédiaire
Nom, Prénom ou Raison sociale : _____ _____	
Adresse ☒ : _____ C.P. [] [] [] [] Ville : _____ Tél. [] [] [] [] [] [] [] [] Fax : [] [] [] [] [] [] [] [] Mobile : [] [] [] [] [] [] [] []	
Envoi des résultats à : <input type="checkbox"/> Exploitant <input type="checkbox"/> Intermédiaire	Envoi de la facture à : <input type="checkbox"/> Exploitant <input type="checkbox"/> Intermédiaire
Pour le payeur : N° TVA Intracommunautaire : _____ Code APE : [] [] [] [] N° SIRET : [] [] [] [] [] [] [] [] Analyse de sol demandée en même temps : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, dans ce cas, prélever <u>obligatoirement</u> l'échantillon à part	Préleveur Si codé barre (labo) coller ici : _____ Date de prélèvement : ____/____/____
Parcelle	
Nom de la parcelle : _____	Nombre d'horizons à analyser : _____
Commune de la parcelle : _____	Epaisseur des horizons, si différente de 30 cm : _____ cm
Noméro du Département de la parcelle : _____	Surface de la parcelle (facultatif) : _____ ha
Coordonnées : _____ / _____	INTERPRÉTATION : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
	Système de coordonnées : _____

☛ : Ne pas faire d'analyse en cas d'apport d'azote minéral ou organique dans le mois précédent ➡ l'interprétation est impossible.

RENSEIGNEMENTS AGRONOMIQUES

Caractéristiques du sol (le type de sol intègre des données relatives au sous-sol)

>> Code type de sol de la parcelle (choisir dans la liste ci-dessous) :
DONNÉE INDISPENSABLE : calcul du reliquat en kg/ha et conseil impossibles si non renseigné

Sols à dominante limoneuse	Sols à dominante argileuse	Sols à dominante sableuse	Sols avec présence de calcaire
LAP Uimon argileux profond	ALP Argile limoneuse profonde	MSG Sableux sur grève	AC Argilo calcaire
LAS Uimon argilo sableux	AP Argile profonde et argile lourde	MSK Sableux sur calcaire dur (bordure)	ACK Sol peu profond sur calcaire dur (bordure)
LMH Uimon moyen hydromorphe	ASI Argile à silex	SAP Sable argileux profond	RGR Craie de Champagne
LMP Uimon moyen profond	ASP Argile sableuse profonde	SLP Sable limoneux profond	CRA Cranette - craie sèche
LMS Uimon moyen sableux profond	MAG Argileux sur grève	SP Sable	GRA Graveluche (Champagne)
LSA Uimon sablo argileux		SC Sable calcaire	LCA Uimon calcaire coloré (Champagne)
LSP Uimon sableux profond			
CR6 Uimon sur cranette à 60 cm			
CR9 Uimon sur cranette à 90 cm			
LSI Uimon à silex			

>> Teneurs de l'horizon superficiel en g/kg = % **Joindre copie de votre analyse ou référence de l'analyse** _____

Teneur en argile vraie (avec decarbonatation)	[] [] [] [] %	pH de l'horizon superficiel	[] [] [] []
Teneur en sables	[] [] [] [] %	Charge en cailloux	[] [] [] [] %
Teneur en calcaire total (CaCO ₃)	[] [] [] [] %	Profondeur de labour	[] [] [] [] cm
Carbone organique total	[] [] [] [] %	Y-a-t-il un obstacle à l'enracinement ?	
Azote total	[] [] [] [] %	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si oui, profondeur :	[] [] [] [] cm

Historique culturel de la parcelle

Labour (occasionnel ou permanent) <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Devenir habituel des résidus 1 <input type="checkbox"/> enlevés ou brûlés 2 <input type="checkbox"/> entoués 1 fois sur 2 3 <input type="checkbox"/> toujours entoués	Habitudes d'apports organiques <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <i>Si oui :</i> Nature 2 <input type="checkbox"/> type lisiers, vinasses, boues... 3 <input type="checkbox"/> type fumiers, composts, Fréquence 2 <input type="checkbox"/> 5 à 10 ans 3 <input type="checkbox"/> 3 à 5 ans 4 <input type="checkbox"/> 1 à 3 ans	Habitudes de cultures intermédiaires <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <i>Si oui :</i> Nature 2 <input type="checkbox"/> crucifères 3 <input type="checkbox"/> graminées <input type="checkbox"/> autres Fréquence 2 <input type="checkbox"/> 3 ans et plus 3 <input type="checkbox"/> 1 à 2 ans	Historique prairie (hors luzerne) 0 <input type="checkbox"/> pas de prairie 3 <input type="checkbox"/> retournement depuis 3 ans ou plus <i>Si non, retournement il y a :</i> 1 <input type="checkbox"/> 1 ans ou moins 2 <input type="checkbox"/> 2 ans Durée de la prairie 1 <input type="checkbox"/> 2 à 3 ans 2 <input type="checkbox"/> 4 à 6 ans 3 <input type="checkbox"/> 7 à 10 ans 4 <input type="checkbox"/> plus de 10 ans
--	--	--	--

Nature du précédent culturel

Culture précédente : _____ Rendement : _____ Q/ha Fertilisation azotée : _____ kg N/ha	Date de récolte du précédent (à défaut, quinzaine) : ____/____/____ Devenir des résidus : <input type="checkbox"/> entoués <input type="checkbox"/> enlevés ou brûlés <input type="checkbox"/> laissés en surface Dans ce cas, date de déchaumage ou d'incorporation : ____/____/____
--	---

Apports de produits organiques pour la culture à fertiliser

Apport non oui

Si oui, nombre de produits : _____

Fournir, si vous la possédez, une copie de l'analyse par fiche de renseignement

Tableau à remplir pour chaque produit organique apporté : <i>Voir la réglementation en vigueur dans votre département</i>			
Code Produit (voir liste)	Quantité (Tonnes ou m ³ /ha)	Date d'apport	
Apport 1	_____	____/____/____	____/____/____
Apport 2	_____	____/____/____	____/____/____
Apport 3	_____	____/____/____	____/____/____

Codes produits organiques :			
FBP Rumier de bovins décomposé	FV Fientes de volailles	BOPA Boudes de papeterie	CFPO Compost de fumier porcin
FCH Rumier de chevaux	LPO Liser de porcins	ECU Ecumes de sucrerie	CU Compost urbain
FO Rumier d'ovins	LB Liser de bovins	VINA Vinasses de sucrerie	LOMB Lombriocompost
FPO Rumier de porcins	LBD Liser de bovins dilué	CDV Compost de déchets verts	EALU Eaux de sucrerie
FUCH Rumier de champignons	LV Liser de volailles	CFB Compost de fumier bovin	EALC Eaux de conserverie
FUV Rumier de volailles	BUL Boudes liquides	CF Compost forestier	
	BUD Boudes déshydratées	CFI Compost fientes de volailles	

Culture intermédiaire précédant la culture à fertiliser

Présence <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Nature de la culture intermédiaire : _____ Rendement : _____ en tonnes MS / ha (très faible 0.5 T ; faible 1T ; moyen 2 T ; élevé 3 T)	Date d'implantation : ____/____/____ Date de destruction : ____/____/____ (chimique, broyage, mécanique ou par le gel)
--	--

Culture à fertiliser

Culture à fertiliser : _____ Date d'implantation de la culture* : ____/____/____ Date probable de récolte* : ____/____/____ * à défaut quinzaine Type d'engrais majoritairement utilisé : 1 <input type="checkbox"/> Ammonitrate 2 <input type="checkbox"/> Nitrate de chaux 3 <input type="checkbox"/> Solution azotée 4 <input type="checkbox"/> Urée 5 <input type="checkbox"/> Ammoniac anhydre 6 <input type="checkbox"/> Phosphate d'ammonlaque 7 <input type="checkbox"/> Sulfate d'ammonlaque	Pour céréales, colza, maïs, lin, tournesol : Rendement prévisionnel : _____ Q/ha (moyenne des 5 dernières années) Autre hypothèse de rendement : _____ Q/ha >> Si la culture à fertiliser est une céréale : Variété : _____ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Stade végétatif</td> <td style="width: 50%;">Population sortie hiver</td> </tr> <tr> <td>1 <input type="checkbox"/> non levé</td> <td>4 <input type="checkbox"/> 1 taille</td> </tr> <tr> <td>2 <input type="checkbox"/> 1 à 2 feuilles</td> <td>5 <input type="checkbox"/> 2 tailles</td> </tr> <tr> <td>3 <input type="checkbox"/> 3 feuilles</td> <td>6 <input type="checkbox"/> 3 tailles</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7 <input type="checkbox"/> 4 tailles et +</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 <input type="checkbox"/> de 141 à 180 pieds / m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 <input type="checkbox"/> de 181 à 230 pieds / m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 <input type="checkbox"/> de 231 à 270 pieds / m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 <input type="checkbox"/> de 271 à 320 pieds / m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12 <input type="checkbox"/> supérieure à 321 pieds / m²</td> </tr> </table> >> Si la culture à fertiliser est un colza : Etat de développement : 1 <input type="checkbox"/> petit 2 <input type="checkbox"/> moyen 3 <input type="checkbox"/> gros ou Azote absorbé _____ en kgN/ha (Azote absorbé = biomasse en kg/m ² x 70 ou méthode visuelle CETIOM)	Stade végétatif	Population sortie hiver	1 <input type="checkbox"/> non levé	4 <input type="checkbox"/> 1 taille	2 <input type="checkbox"/> 1 à 2 feuilles	5 <input type="checkbox"/> 2 tailles	3 <input type="checkbox"/> 3 feuilles	6 <input type="checkbox"/> 3 tailles		7 <input type="checkbox"/> 4 tailles et +		8 <input type="checkbox"/> de 141 à 180 pieds / m ²		9 <input type="checkbox"/> de 181 à 230 pieds / m ²		10 <input type="checkbox"/> de 231 à 270 pieds / m ²		11 <input type="checkbox"/> de 271 à 320 pieds / m ²		12 <input type="checkbox"/> supérieure à 321 pieds / m ²
Stade végétatif	Population sortie hiver																				
1 <input type="checkbox"/> non levé	4 <input type="checkbox"/> 1 taille																				
2 <input type="checkbox"/> 1 à 2 feuilles	5 <input type="checkbox"/> 2 tailles																				
3 <input type="checkbox"/> 3 feuilles	6 <input type="checkbox"/> 3 tailles																				
	7 <input type="checkbox"/> 4 tailles et +																				
	8 <input type="checkbox"/> de 141 à 180 pieds / m ²																				
	9 <input type="checkbox"/> de 181 à 230 pieds / m ²																				
	10 <input type="checkbox"/> de 231 à 270 pieds / m ²																				
	11 <input type="checkbox"/> de 271 à 320 pieds / m ²																				
	12 <input type="checkbox"/> supérieure à 321 pieds / m ²																				
Apport d'azote en localisé <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Irrigation <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui, quantité prévue : _____ mm																					

Bon pour commande Signature :

Le ____/____/____

- RELIQUATS D'AZOTE MINERAL -

Pour tout renseignement concernant ce bulletin, contactez
notre assistance téléphonique au 03 23 23 95 29 (ou 95 28,
ou 03 23 23 64 76).

Nos références

A_RE08.7519

Code client LDAR : 26050412

LDAR -
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
ANALYSES ET RECHERCHE
RUE FERNAND CHRIST
02007 LAON CEDEX

Vos références Parcelle: **MONT DES RUES VENET**


TUIGNY (02)
Betterave sucrière

L'échantillon

Prélevé le :	12/02/2008	Coordonnées :	Intermédiaire
Nom préleveur :			Code client LDAR : 26050412
Arrivé le :	15/02/2008	Système :	LDAR -
Edité le :	17/11/2008		LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
Code DP :	02FON	Bulletin interprétable :	ANALYSES ET RECHERCHE
Interprétation :	Oui	Oui	RUE FERNAND CHRIST
			02007 LAON CEDEX

Résultats d'analyse et profil d'azote minéral du sol

Référence	Horizon	Densité Apparente	Eau %	Résultats en mgN par kg de terre sèche			Profil d'azote en kgN/ha		
				N-NH ₄	N-NO ₃	N-MINE	N-NH ₄	N-NO ₃	N-MINE
20779	0 - 30	1,4	25,2	0,4	5,7	6,1	1,9	23,9	25,8
20780	30 - 60	1,5	23,4	0,4	6,4	6,8	1,9	28,9	30,8
20781	60 - 90	1,5	22,4	0,4	2,7	3,1	1,6	12,2	13,8
TOTAL							5.4	64.9	70.3
Reliquat utilisable sur 90 cm							66.7		



DOSE CONSEILLEE

Pour la culture : Betterave sucrière

Dose totale à apporter : 50 kg N / ha

La dose indiquée tient compte de la volatilisation.

Le conseil de fumure est élaboré sans tenir compte de l'analyse de terre en cours. Si à réception des résultats de celle-ci, vous désirez une nouvelle interprétation, merci de nous le demander.

Azofert est un outil d'aide à la décision qui fournit des doses prévisionnelles. Ces doses dépendent fortement de la représentativité des prélèvements et de la précision des renseignements fournis par le client. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

Renseignements cultureux fournis

Caractéristiques physiques du sol :

Type de sol	Limon moyen profond		
Argile vraie (%)		pH	
Sables (%)		Charge en cailloux (%)	
Calcaire (%)		Profondeur de labour (cm)	30
Carbone organique total (%)		Profondeur d'enracinement (cm)	120
Azote total (%)			

Historique culturel :

Labour occasionnel ou permanent	oui		
Devenir habituel des résidus	Toujours enfouis		
Habitudes d'apports organiques	Type lisier, vinasses, boues	tous les moins de 3 ans	
Habitudes de cultures intermédiaires	Type crucifères	tous les 1 à 2 ans	
Prairie, date de retournement		Durée de la prairie	

Précédent culturel :

Nature	Blé	Date de récolte	20/07/2007
Rendement	83 q	Devenir des résidus	Enfouis
Fertilisation	188 kg / ha	Date d'incorporation	05/08/2007

Apports organiques :

	Produit(s)	Quantité	Date d'apport
Apport organique	Vinasses de sucrerie	3	20/08/2007

Culture intermédiaire :

Nature	Moutarde
Rendement	3 T MS / ha
Date d'implantation	24/08/2007
Date de destruction	20/11/2007

Culture à fertiliser :

Nature	Betterave sucrière		
Stade végétatif			
Population			
Rendement prévisionnel		Autre hypothèse de rendement	
Date d'implantation	15/03/2008	Irrigation	
Date récolte		Type d'engrais	ammonitrate
		Apport localisé	Non

Informations sur les renseignements fournis

- Une analyse de terre assure une meilleure fiabilité de l'interprétation.

Interprétation : dose prévisionnelle et bilan simplifié

le calcul du bilan pour une culture de Betterave sucrière réalisé sur la parcelle MONT DES RUES VENET est résumé dans le tableau suivant :

	Calcul du bilan			
Rendement (q/ha)				
I. Besoins totaux (kgN/ha)	242			
II. Azote fourni par le sol (kgN/ha)	165			
III. Autres fournitures (kgN/ha)	55			
IV. Azote non utilisable (kgN/ha)	29			
Dose totale (kgN/ha)	50			

Commentaires sur les postes du bilan

La contribution en azote des produits organiques est estimée à partir d'une composition moyenne, rendant l'estimation de ce terme plus aléatoire

La profondeur de labour prise en compte pour le calcul de la minéralisation de l'azote organique humifié est de 28, cm

Plan de fumure azoté de la parcelle - Bilan azoté

Pour que ce plan de fumure soit conforme aux règles de la conditionnalité des aides PAC, il vous suffit de compléter le n° d'ilot PAC, la surface de la parcelle, le tableau prévisionnel des apports et les modalités de gestion de l'interculture.

Nom ou numéro de parcelle : **MONT DES RUES VENET**
 Numéro d'ilot PAC :
 Surface (ha) :
 Type de sol : Limon moyen profond
 Culture : Betterave sucrière
 Précédent : Blé

Objectif de rendement	
prévisionnel	autre hypothèse

Besoin unitaire en azote, en kg/q (cultures récoltées en graines) :

Objectif de rendement (q/ha) :

		En kgN/ha		
I. BESOINS TOTAUX	1	Besoins alimentaires de la culture	220	
	2	Azote restant dans le sol après la culture	22	22
		TOTAL (A)	242	
II. AZOTE FOURNI PAR LE SOL	3	Azote déjà absorbé pendant l'automne - hiver	0	0
	4	Reliquat d'azote minéral dans le sol sortie hiver	67	67
	5	Minéralisation de l'humus	98	98
	6	Arrière effet prairie		
		SOUS-TOTAL 1	165	165
III. AUTRES FOURNITURES D'AZOTE	7	Effet culture intermédiaire	33	33
	8	Minéralisation des résidus du précédent	4	4
	9	Effet direct des amendements organiques	9	9
	10	Apports pluviométriques	9	9
	11	Apport par l'irrigation	0	0
	12	Fixation symbiotique	0	0
		SOUS-TOTAL 2	55	55
IV. AZOTE NON UTILISABLE	13	Lessivage de l'azote du sol	6	6
	14	Organisation microbienne de l'azote de l'engrais	20	
	15	Volatilisation de l'azote de l'engrais	3	
		SOUS-TOTAL 3	29	
		TOTAL (B) = 1 + 2 - 3	191	
APPORT PREVISIONNEL EN ENGRAIS MINERAL (C) = (A) - (B)			50	
COMPLEMENT (selon outil de diagnostic ou cahier des charges justifié techniquement)				
DOSE TOTALE PREVISIONNELLE				

PREVISIONNEL DES APPORTS

Nature de l'effluent ou de l'engrais	Date / période d'apport prévue	Surface épanchée (ha)	Dose (t ou m ³ /ha)	Teneur en azote total (kg N/t ou m ³)	N total (kg N/ha)
TOTAL DES APPORTS D'AZOTE TOTAL PREVUS SUR LA CAMPAGNE					

MODALITES DE GESTION DE L'INTERCULTURE PREVUE

Devenir prévu des résidus de culture : enfouis brûlés exportés

Devenir des repousses de culture en place : enfouies détruites exportées

Implantation de cultures intermédiaires après la culture : Nature :

Date d'implantation prévue : Date de destruction prévue :

Impact environnemental de la fertilisation

La dose indiquée tient compte du lessivage, estimé à partir de données climatiques moyennes. Ne pas en tenir compte en cas d'année sèche.

La dose indiquée tient compte de la volatilisation

Le projet Azofert a été initié par l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, unité d'Agronomie de Laon-Reims-Mons) et le LDAR (Laboratoire d'Analyse et de Recherche de l'Aisne). La réalisation et l'amélioration du logiciel, son évaluation et son adaptation dans des contextes variés ont ensuite été conduits dans le cadre du Groupement d'Intérêt Scientifique « Fertilisation raisonnée » avec l'aide de l'Institut technique de la Betterave Industrielle (ITB) et du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL). Ce travail d'amélioration constante du logiciel et d'appui à l'appropriation par les utilisateurs se poursuit dans le cadre du Réseau Mixte Technologique « Fertilisation et Environnement » avec l'appui des instituts techniques, chambres d'agriculture et établissement d'enseignement techniques agricoles membres de ce réseau.

L'édition de cette brochure a bénéficié du soutien financier du compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural géré par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Conception :

*INRA Agronomie Laon Reims Mons
Laboratoire Départemental
d'Analyses et de Recherche de
L'Aisne*



Réalisation

INRA Agronomie Laon Reims Mons



Diffusion :

*Société So'néo
7 rue de la Petite Cité BP 552
27005 EVREUX CEDEX
www.so-neo.fr*

